

## 要 旨

### 試験委託者

環境庁

### 表 題

1,3-ジクロロプロペンの藻類 (*Selenastrum capricornutum*) に対する生長阻害試験

### 試験番号

1999-生17

### 試験方法

本試験は、OECD 化学品テストガイドライン No. 201 「藻類生長阻害試験」 (1984年) に準拠して実施した。

- 1) 被験物質: 1,3-ジクロロプロペン
- 2) 暴露方式: 止水式, 振とう培養 (100rpm)
- 3) 供試生物: *Selenastrum capricornutum* (ATCC22662)
- 4) 暴露期間: 72時間
- 5) 試験濃度 (設定値):  
対照区, (助剤対照区: メタノール), 0.010, 0.032, 0.10,  
0.32, 1.0, 3.2, 10 mg/L  
公比; 3.2, (助剤対照区; メタノール100  $\mu$ L /L)
- 6) 試験液量: 100 mL (OECD培地) / 容器 (密閉容器)
- 7) 連数: 3 容器 / 濃度区
- 8) 初期細胞濃度:  $1 \times 10^4$  cells/mL
- 9) 試験温度:  $23 \pm 2$  °C
- 10) 照明: 4000 lux ( $\pm 20\%$ の変動内, フラスコ液面付近) で連続照明
- 11) 分析法: GC-MS法

## 結 果

### 1) 試験液中の被験物質濃度

被験物質の測定濃度が開始時において設定値の±20%を超えたものがあったため、下記の生長  
阻害濃度の算出には開始時の測定値を採用した。

### 2) 生長曲線下面積の比較による阻害濃度

50%生長阻害濃度 EbC50(0-72) : 0.241 mg/L (95%信頼区間 : 0.118~0.493 mg/L)  
最大無作用濃度 NOECb(0-72) : 0.009 mg/L

### 3) 生長速度の比較による阻害濃度

50%生長阻害濃度 ErC50(24-48) : 8.60 mg/L (95%信頼区間 : 7.77~9.43 mg/L)  
最大無作用濃度 NOECr(24-48) : 0.97 mg/L  
50%生長阻害濃度 ErC50(24-72) : > 9.53 mg/L  
最大無作用濃度 NOECr(24-72) : 2.72 mg/L