

要 旨

試験委託者 環境省

表 題 2,5-ジクロロアニリンの藻類 (*Selenastrum capricornutum*) に対する生長阻害試験

試験番号 No. 2000-生17

試験方法

本試験は、OECD 化学品テストガイドライン No. 201「藻類生長阻害試験」(1984年)に準拠して実施した。

- 1) 被験物質: 2,5-ジクロロアニリン
- 2) 暴露方式: 止水式, 振とう培養 (100rpm)
- 3) 供試生物: *Selenastrum capricornutum* (ATCC22662)
- 4) 暴露期間: 72時間
- 5) 試験濃度 (設定値):
対照区, 助剤対照区 (メタノール), 0.064, 0.20, 0.64, 2.0, 6.4, 20, 64 mg/L
公比; 3.2
- 6) 試験液量: 100 mL (OECD培地) / 容器
- 7) 連数: 3 容器 / 濃度区
- 8) 初期細胞濃度: 1×10^4 cells/mL
- 9) 試験温度: 23 ± 2 °C
- 10) 照明: 4000 ~ 5000 lux (フラスコ液面付近) で連続照明
- 11) 分析法: HPLC法

結 果

1) 試験液中の被験物質濃度

被験物質の測定濃度が開始時において設定値の±20%以内であり、下記の生長阻害濃度の算出には設定値を採用した。

2) 生長曲線下面積の比較による阻害濃度

50%生長阻害濃度 EbC50(0-72) : 3.79 mg/L (95%信頼区間 : 2.96 ~ 4.86 mg/L)
最大無作用濃度 NOECb(0-72) : 0.64 mg/L

3) 生長速度の比較による阻害濃度

50%生長阻害濃度 ErC50(24-48) : 13.3 mg/L (95%信頼区間 : 12.6 ~ 14.1 mg/L)
最大無作用濃度 NOECr(24-48) : 6.4 mg/L
50%生長阻害濃度 ErC50(24-72) : 14.9 mg/L (95%信頼区間 : 13.9 ~ 16.0 mg/L)
最大無作用濃度 NOECr(24-72) : 6.4 mg/L